

Torlós

Losartana potássica

Composição e apresentações - Cada comprimido contém 25 ou 50 mg de losartana potássica. Embalagens com 28 comprimidos de 25 mg; 14 e 28 comprimidos de 50 mg.

Indicação - Hipertensão arterial.

Contraindicações - Hipersensibilidade à losartana ou aos demais componentes da fórmula.

Gravidez e lactação - Está contraindicado durante a gravidez e quando esta for detectada o seu uso deve ser interrompido imediatamente. Em relação à lactação, deve-se optar pela interrupção do tratamento ou da amamentação quando a droga for vital para a mãe.

Precauções e advertências - Cautela em pacientes com insuficiência renal ou hepática graves. Cautela no início do tratamento de pacientes com ICC ou depletados de sódio, pois pode causar um quadro de hipotensão severa. Nos pacientes com enfermidade cerebrovascular ou cardiopatia isquêmica, nos quais o quadro pode se agravar como consequência de uma hipotensão severa. Apresenta efeito uricosúrico potente.

Interações medicamentosas - Tem-se relatado efeitos natriuréticos e efeitos depletadores de potássio. Recomenda-se controle periódico dos níveis de potássio em pacientes em tratamento com diuréticos. Toxicidade ao lítio em pacientes em tratamento com drogas que aumentam a eliminação de sódio.

Reações adversas - As mais frequentes são: mal-estar epigástrico, diarreia, mialgia, câibras, tonturas, insônia, congestão nasal, astenia, fraqueza, edema ou inchaço local, náuseas, faringites, cefaleia, hipotensão ortostática.

Posologia - A dose inicial usual é de 50 mg uma vez ao dia, ou 25 mg em pacientes com possível depleção de volume intravascular, e em pacientes com histórico clínico de insuficiência hepática. TORLÓS pode ser administrado 1 ou 2 vezes ao dia, com doses diárias variando de 25 a 100 mg.

Venda Sob Prescrição Médica.

Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.

Registro no M.S. 1.0525.0005.

TORRENT do Brasil Ltda.