

Pantelmin®

mebendazol

Comprimidos

Anti-helmíntico de amplo espectro

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Comprimidos de 500 mg em embalagem com 1 comprimido.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO ORAL

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido contém 500 mg de mebendazol.

Excipientes: amido de milho, amidoglicolato de sódio, aroma de morango, celulose microcristalina, dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio, lactose, metilcelulose e sacarina sódica.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Em pacientes que vivem em áreas altamente endêmicas, o tratamento com **Pantelmin® 500 mg** (3 a 4 vezes ao ano) irá reduzir substancialmente a carga de vermes e mantê-la bem abaixo dos níveis de significância clínica.

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Pantelmin® 500 mg serve para tratar infestações simples ou mistas por *Enterobius vermicularis*, *Trichuris trichiura*, *Ascaris lumbricoides*, *Ancylostoma duodenale* e *Necator americanus*.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Contra-indicações
Não use **Pantelmin® 500 mg** em crianças com menos de 1 ano de idade.

Não use **Pantelmin® 500 mg** se você apresentar maior sensibilidade (alergia) ao mebendazol ou aos excipientes da formulação.

Advertências

Pantelmin® não deve ser utilizado por longos períodos. Se uma grande quantidade de **Pantelmin® 500 mg** for ingerida todos os dias durante alguns meses, pode ocorrer distúrbio do fígado. Portanto, tratamentos longos só devem ser realizados sob intensa supervisão médica.

Efeito sobre a capacidade de dirigir ou utilizar máquinas

Você pode usar **Pantelmin® 500 mg** sem problemas, pois não afeta o seu estado de alerta ou a habilidade de dirigir.

Gravidez e Amamentação

Não se aconselha o uso de

Pantelmin® durante a gravidez, especialmente nos primeiros três meses. Não use este medicamento durante a amamentação.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

Atenção: Este medicamento contém Açúcar (amido), portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes.

Precauções

Pode ocorrer distúrbio do fígado, se for necessário usar grandes quantidades de **Pantelmin® 500 mg** diariamente por vários meses. Por esta razão, deve-se realizar, com cuidado e com orientação do médico, o tratamento prolongado.

As parasitoses intestinais são amplamente difundidas em todas as classes sociais, acometendo tanto adultos como crianças.

Seguem alguns conselhos sobre:

COMO EVITAR A VERMINOSE.

1. Beba somente água filtrada ou fervida.
2. Lave cuidadosamente as frutas e verduras e cozinhe bem os alimentos.
3. Coma apenas carne bem passada.
4. Ande sempre com os pés calçados.
5. Lave as mãos antes das refeições e após usar os sanitários.
6. Conserve sempre as unhas cortadas e limpas.
7. Mantenha as instalações sanitárias em boas condições de higiene.
8. Siga corretamente estes conselhos, evitando que os vermes atinjam toda a família.

Consulte regularmente seu médico.

Interações Medicamentosas

Informe seu médico se você estiver usando cimetidina (um medicamento contra a acidez do estômago). Se você precisar tomar mais que um comprimido de **Pantelmin® 500 mg**, seu médico poderá fazer um ajuste da dose. O uso de **Pantelmin®** (mebendazol) com metronidazol (um medicamento utilizado para infecções bacterianas e por protozoários) deve ser evitado.

Este medicamento é contra-indicado em crianças menores de 1 ano de idade. Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Aspecto Físico

Pantelmin® 500 mg apresenta-se sob a forma de comprimidos esbranquiçados circulares.

Características Organolépticas

Os comprimidos de **Pantelmin® 500 mg** possuem aroma e sabor artificial de morango.

Dosagem

As crianças com mais de 1 ano de idade e os adultos normalmente tomam **Pantelmin® 500 mg** de uma só vez. Não altere esta quantidade, a menos que seu médico o oriente. Em regiões onde as infestações por vermes são frequentes, as crianças acima de 1 ano e os adultos devem tomar **Pantelmin® 500 mg** 3 a 4 vezes ao ano. Desta forma, as infestações por vermes podem ser mantidas em níveis baixos em toda a população.

Como Usar

Tome **Pantelmin® 500 mg** com um pouco de líquido. Não é necessário tomar o comprimido junto com os alimentos, nem seguir uma dieta especial ou utilizar produtos que estimulem a evacuação.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Pantelmin® 500 mg é bem tolerado e poucos efeitos indesejáveis ocorrem nas doses prescritas. Entretanto, os efeitos indesejáveis a seguir podem ocorrer:

- Dor de estômago de curta duração e diarreia podem ocorrer às vezes, particularmente se a sua infestação por vermes for grave. Estes efeitos são de curta duração e você pode utilizar **Pantelmin® 500 mg** de forma segura novamente em outra ocasião.

- Hipersensibilidade ao **Pantelmin®** é muito rara. Pode ser reconhecida,

por exemplo, por erupção cutânea, coceira, encurtamento da respiração e/ou inchaço da face. Se algum destes sintomas ocorrerem, pare de tomar **Pantelmin® 500 mg** e procure um médico.

- Distúrbio grave da pele consistindo de erupções cutâneas, bolhas na pele e feridas na boca, olhos ou na região anogenital, em conjunto com febre foi muito raramente relatado. Se você apresentar estes sintomas, entre em contato com um médico imediatamente.

- Muito raramente convulsões podem ocorrer em bebês com o uso de **Pantelmin®**. Entretanto, **Pantelmin® 500 mg** não deve ser administrado em crianças menores de 1 ano de idade.

- Muito raramente problemas no sangue, fígado e rim podem ocorrer com o uso prolongado de **Pantelmin®** em doses substancialmente maiores do que as doses recomendadas (muito maior do que é normalmente prescrito).

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Se você ingerir uma grande quantidade de **Pantelmin® 500 mg**, você poderá sofrer de cólicas estomacais, náuseas, vômitos e diarreia. Se este for o caso, consulte um médico. O médico pode recomendar que você utilize carvão ativado, que irá absorver o **Pantelmin®** que estiver em excesso no seu estômago.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conserve **Pantelmin® 500 mg** em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

DIZERES LEGAIS

MS-1.1236.3333

Farmacêutico Responsável:

Marcos R. Pereira - CRF-SP nº 12304

JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA.

Rodovia Presidente Dutra, km 154

São José dos Campos - SP

CNPJ 51.780.468/0002-68

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

Lote, Data de Fabricação e Validade: Vide Cartucho

Não há direitos de patente concedidos nos Estados Unidos. No United States patent rights are granted.



ESPECIFICAÇÕES	CORES
ITEM: Bula	
PRODUTO: Pantelmin 500 mg CP	■ Black
CÓD.: 500002106	
FORMATO: 125 X 250 mm	
CÓD. VISUAL:	
DATA: 18/09/2008	
SUB. CÓD.: 500001804	
Alterado por: Luiz	