

DAFLON 500

Apresentações

Caixas com 15, 30 e 60 comprimidos revestidos.

Composição

Fração flavonóica purificada, sob forma micronizada contendo 450 mg de diosmina e 50 mg de flavonóides titulados em hesperidina.

Propriedades

Venotónico e vasculoprotetor.

Indicações

Em Flebologia: Varizes e varicosidades, insuficiência venosa (edema, sensação de peso nas pernas etc.), seqüelas de tromboflebites, estados pré- ulcerosos e úlceras varicosas, edemas pós-traumáticos.

Em Proctologia: Hemorróidas e crises hemorroidárias.

Em Ginecologia e Obstetrícia: Insuficiência venosa da mulher grávida; prevenção da congestão pélvica e do risco venoso no decurso do tratamento com anticoncepcionais, menorragias funcionais, prevenção das menorragias devidas ao DIU (dispositivo intra-uterino).

Em Oftalmologia: Hemorragias por fragilidade dos microvasos (hemorragias subconjuntivais e retinianas), na fragilidade epitelial devido ao uso de lentes de contato.

Em ORL: Hemorragias pós-amigdalectomia, epistaxes etc.

Em Odontologia: Hemorragias gengivais e pós-extração dentária. Na prevenção do risco vascular geral:

Nas manifestações hemorrágicas da arteriosclerose, hipertensão, diabetes, doença hepática etc.

Farmacocinética

No homem, após administração por via oral do medicamento verifica-se: rápida absorção pela mucosa digestiva; forte metabolização que é evidenciada pela presença de diferentes fenóis ácidos na urina; meia-vida de eliminação de 11 horas com excreção essencialmente fecal (80%) e urinária de aproximadamente 14%.

Farmacologia

Daflon 500 exerce uma ação sobre o sistema vascular de retorno: ao nível das veias, diminui a distensibilidade venosa e reduz a estase venosa; ao nível da microcirculação, normaliza a permeabilidade capilar e reforça a resistência capilar.

Farmacologia clínica

Os estudos em duplo- cego utilizando métodos que permitem objetivar e quantificar a atividade de **Daflon** 500 sobre a hemodinâmica venosa, confirmaram as propriedades farmacológicas deste medicamento no homem.

Relação dose/efeito

A existência de relações dose/efeito, estatisticamente significativas, baseia-se nos parâmetros pletismográficos venosos: capacitância, distensibilidade e tempo de escoamento. A melhor relação dose/efeito é obtida com a posologia de 2 comprimidos ao dia.

Atividade venotônica

DAFLON 500 aumenta o tônus venoso. A pletismografia de oclusão venosa por manguito de compressão de mercúrio evidencia uma diminuição dos tempos de escoamento venoso.

Atividade microcirculatória

Os estudos realizados em duplo- cego mostraram uma diferença estatisticamente significativa entre o medicamento e o placebo. Nos pacientes que apresentam sinais de fragilidade capilar, Daflon 500 aumenta a resistência capilar medida por angiosterometria.

Clínica

Os estudos clínicos realizados em duplo- cego contra placebo colocam em evidência a atividade terapêutica de Daflon 500 em flebologia, no tratamento da insuficiência venosa crônica, funcional e orgânica, dos membros inferiores.

Precauções de uso

Não se dispõe, até o momento, de dados sobre o uso de Daflon **500** em portadores de insuficiência hepática ou renal. Embora os estudos realizados em animais de laboratório não tenham demonstrado toxicidade em relação às funções de reprodução, não há avaliação em humanos portanto, o uso do produto em gestantes e lactantes deverá ser cauteloso, considerando risco/benefício.

Contra-Indicações

Não se conhece até o momento nenhuma contra- indicação para o uso de DAFLON 500. Veja o item Precauções.

Reações adversas

Alguns casos de alterações digestivas leves e de alterações neurovegetativas foram observados, não obrigando nunca a interrupção do tratamento.

Posologia e modo de administração

A posologia usual é de 2 comprimidos revestidos ao dia: um pela manhã e outro à noite, de preferência durante as refeições.

Superdosagem

Não se dispõe até o momento de dados a cerca de superdosagem.

DAFLON 500 – Laboratório SERVIER
RUA MARIO PIRAGIBE, 23
RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20720320
Tel: (021)289-2832
Fax: (021)593-0774

