

Icaden®

**nitrate de isoconazol (creme)
isoconazol (solução / spray)**

Formas farmacêuticas e apresentações:

Creme: cartucho com bisnaga de 20 g

Solução: cartucho com frasco de 30 ml

Spray: cartucho com frasco de 60 ml

Icaden® deve ser administrado da seguinte forma:

Uso tópico (não oftálmico)

USO ADULTO E PEDIÁTRICO**Creme**

Cada g de Icaden® contém 10 mg de nitrato de isoconazol (correspondente a 8,81 mg de isoconazol).

Excipientes: estearato de macrogol-sorbitano, estearato de sorbitano, álcool cetosteárilico, parafina viscosa, vaselina branca e água desmineralizada

Solução / Spray

Cada ml de Icaden® contém 10 mg de isoconazol.

Excipientes: macrogol e álcool etílico

Informações ao paciente:**Como este medicamento funciona?**

Antes de iniciar o uso de um medicamento, é importante ler as informações contidas na bula, verificar o prazo de validade e a integridade da embalagem. Mantenha a bula do produto sempre em mãos para qualquer consulta que se faça necessária. Leia com atenção as informações presentes na bula antes de usar o produto, pois ela contém informações sobre os benefícios e os riscos associados ao uso do produto. Você também encontrará informações sobre o uso adequado do medicamento.

► O que é Icaden® ?

Icaden® é um medicamento antifúngico (antimicótico) disponível nas formas de creme dermatológico e

solução tópica/spray e que possui em sua composição a substância isoconazol/nitrato de isoconazol.

► Como Icaden® funciona?

O isoconazol, presente em Icaden®, é um antimicótico eficaz contra fungos, leveduras e mofo que provocam micoses na pele.

Por que Icaden® foi indicado?

Icaden® serve para o tratamento de infecções superficiais na pele, provocadas pelos microorganismos citados acima.

Quando não devo usar Icaden®?**► Contra-indicações**

Você não deve usar Icaden® no caso de ter hipersensibilidade (sensibilidade excessiva que causa alergia) ao isoconazol ou a qualquer componente da fórmula (composição do medicamento).

► Advertências

"Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis."

"Informe ao seu médico se ocorrer gravidez ou se iniciar amamentação durante o uso deste medicamento."

"Pode-se usar este medicamento, durante a gravidez, sob determinação médica ou do cirurgião-dentista."

► Que precauções devem ser adotadas?

Deve-se usar uma formulação oleosa neutra caso ocorra ressecamento excessivo da pele durante o tratamento com Icaden® solução/spray.

Deve-se evitar o contato com os olhos, se você usar Icaden® no rosto. Caso ocorra tal contato, lave-os imediatamente com bastante água ou com soro fisiológico.

No caso de infecções na região entre os dedos das mãos ou dos pés, aconselha-se manter uma tira de gaze (atadura) com Icaden® creme no local afetado. Para evitar nova infecção, recomenda-se a troca diária e a fervura das toalhas e das roupas íntimas, que devem ser preferencialmente de algodão.

Mantenha limpo o local afetado. Em casos de pé de atleta (doença da pele localizada entre os dedos dos pés), deve-se secar, cuidadosamente, os espaços entre os dedos após o banho. Você também deve trocar as meias diariamente. Icaden®, nas formas de solução tópica (medicamento de uso externo) e de spray, contém álcool em sua fórmula. Por isso, deve-se evitar a aplicação deste produto próximo ao fogo ou a objetos incandescentes (em brasa).

- Gravidez

O uso de medicamentos que contêm isoconazol, durante a gravidez, não indica risco de ocorrência de malformação no feto.

- Amamentação

Há pouca possibilidade de transferência de quantidades de isoconazol para o bebê através do leite materno.

► Interações medicamentosas

"Informe ao seu médico ou ao cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento."

"Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico; pode ser perigoso para sua saúde."

"Informe ao seu médico ou ao cirurgião dentista se você faz uso de outro medicamento."

Como devo usar este medicamento?**► Aspecto físico:**

Creme: creme de cor branca a levemente amarelado, opaco

Solução tópica: incolor (sem cor)

Spray: solução incolor

► Características organolépticas:

Creme: sem odor (cheiro) ou gosto característico
Solução tópica/spray: odor levemente alcoólico (com cheiro de álcool)


► Dosagem

Ver "Como usar"

► Como usar

Deve-se aplicar Icaden® uma vez por dia nas áreas afetadas da pele, a menos que seu médico recomende outra frequência de uso.


Para usar o medicamento na forma spray, veja as instruções abaixo:



Retire a tampa protetora do tubo



Mantenha o tubo em posição vertical (de pé).



Pressione a válvula em direção à região afetada.

Podem ser necessário pressionar a válvula 3 ou 4 vezes para que o jato inicie. Não use uma dose deste produto maior do que a recomendada pelo médico, pois você poderá ter reações desagradáveis no local de aplicação. Como regra geral para infecções fúngicas (infecções causadas por fungos), deve-se manter a terapia tópica (tratamento com medicamentos de uso externo), por um período de 2 a 3 semanas, e até por 4 semanas em infecções resistentes ao tratamento (particularmente infecções na

região entre os dedos das mãos ou dos pés). Períodos de tratamento mais prolongados também são possíveis. Para evitar recorrência (repetição da doença), deve-se continuar o tratamento por, pelo menos, 2 semanas após a cura clínica.

► Caso você esqueça de usar Icaden®:

Se você esquecer de aplicar uma dose, não aumente a quantidade de Icaden® para compensar uma dose esquecida.

► Efeitos quando você interrompe o tratamento com Icaden®:

Se você usar Icaden® de forma correta, os sintomas devem melhorar durante o tratamento e permanecerem ausentes após a conclusão do tratamento. Se os sintomas persistirem ou voltarem a ocorrer, entre em contato com seu médico.

"Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento."

"Siga a orientação de seu médico. Respeite sempre os horários, as doses e a duração do tratamento."

"Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico."

Quais os males que este medicamento pode causar?

► Reações Adversas

Podem ocorrer reações desagradáveis com o uso de Icaden®, assim como acontece com todos os medicamentos.

Em casos isolados, sob tratamento com Icaden®, podem ocorrer sintomas, tais como, coceira, ardor, vermelhidão ou formação de bolhas na área afetada da pele.

Podem ocorrer reações alérgicas na pele.

"Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis."

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?

Não se espere nenhum risco grave após uma aplicação na pele de uma superdose (isto é, quando o medicamento é aplicado uma vez em uma área extensa da pele) ou após uma ingestão acidental.

Onde e como devo guardar Icaden®?

O medicamento deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

"Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças."

Venda sob prescrição médica

Lote, data de fabricação e validade: *vide* cartucho.

MS-1.0020.0024

Farm. Resp.: Dr. Carlos Akira Furukawa

CRF-SP nº 13.271

Fabricado por:

Newprod S. A. I. C.

Buenos Aires - Argentina

Importado por:

Schering do Brasil, Química e Farmacêutica Ltda.

Rua Cancioneiro de Évora, 255/339/383 - Santo Amaro

04708-010 - São Paulo - SP

C.N.P.J. nº 56.990.534./0001-67

www.schering.com.br

Atendimento ao Consumidor **0800 7021241**

VE01111