Iodo ressublimado Óleo de cade Ácido salicílico

- FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO Solução Tópica - Frasco com 30 ml USO EXTERNO - PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO - HEBRIN

INFORMAÇÕES AO PACIENTE - HEBRIN

Conserve o medicamento em lugar fresco, ao abrigo da luz.

Prazo de validade e lote vide cartucho.

Não uso qualquer medicamento após o vencimento do prazo de validade.

Informe seu médico a ocorrência de uma gravidez durante o tratamento.

Siga corretamente as indicações de seu médico. Não desaparecendo os sintomas ou no caso de aparecimento de reações diferentes ou desagradáveis consulte seu médico. "TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS". NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS - HEBRIN

- INDICAÇÕES Intertrigo micótico (eczema marginado de Hebra); tricomicoses e tinhas; epidermomicoses dasmãos e dos pés ("pés de atleta").

CONTRA-INDICAÇÕES - HEBRIN

HEBRIN NÃO DEVE SER USADO NAS AFECÇÕES CUTÂNEAS PURULENTAS OU IMPETIGINADAS E POR PACIENTES SENSÍVEIS AO IODO.

- PRECAUCÕES

A APLICAÇÃO TÓPICA DE HEBRIN DEVERÁ SER DESCONTINUADA SE EVIDENCIADA SENSIBILIZAÇÃO OU IRRITAÇÃO LOCAL. O ÁCIDO SALICÍLICO PODE SER ABSORVIDO A PARTIR DO LOCAL DA APLICAÇÃO TÓPICA. É LENTAMENTE EXCRETADO PELA URINA E PODE CAUSAR SALICILISMO. ASSIM SENDO, NÃO DEVERÁ SER USADO SOBRE GRANDES ÁREAS POR TRATAMENTOS PROLONGADOS. CONVÉM LEMBRAR QUE O USO DE HEBRIN PODE ALTERAR OS TESTES LABORATORIAIS DE IODO LIGADO À PROTEÍNA.

- REAÇÕES ADVERSAS

POUCÁS REAÇÕES PODEM OCORRER COM A APLICAÇÃO TÓPICA DA PREPARAÇÃO: PRURIDO, IRRITAÇÃO LOCAL E, OCASIONALMENTE, DERMATITE ALÉRGICA.

- POSOLOGIA

Esfregar algodão embebido de **HEBRIN** no local afetado, sem exercer pressão muito forte, uma ou duas vezes ao dia, de preferência após o banho. Nas crianças, o **HEBRIN** deve ser diluído em partes iguais de álcool antes de ser usado.