

**Artelac®**

Hipromelose 3,2 mg/mL



Solução para uso oftálmico em frasco conta-gotas contendo 10 mL.

**USO PEDIÁTRICO E ADULTO****COMPOSIÇÃO**

Cada 1 mL de produto contém: 3,20 mg de hipromelose. Outros componentes: cetrimida, fosfato dissódico dodecahidratado, fosfato dihidrogenado de sódio, edetato dissódico, sorbitol, água purificada.

Cada mL equivale à 25 gotas.

**AÇÃO DO MEDICAMENTO**

A hipromelose auxilia na manutenção do meio ocular, agindo com uma substituta da lágrima. Artelac® começa agir imediatamente após a instilação.

**INDICAÇÕES**

Artelac® é indicado para o tratamento sintomático das manifestações de ressecamento da córnea e conjuntiva, causadas por secreção lacrimal deficiente e distúrbios funcionais resultantes de processos patológicos locais ou sistêmicos, bem como no caso de ausência ou deficiência do fechamento da pálpebra.

**CONTRA-INDICAÇÕES**

Hipersensibilidade a um dos componentes da fórmula.

**PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS**

Produto exclusivo para uso oftálmico.

Os usuários de lentes de contato devem remover as lentes antes da aplicação do produto, e aguardar 15 minutos antes de recolocá-las.

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Não há registro de interações medicamentosas para Artelac®.

Não há contra-indicação relativa a faixas etárias. Informe ao médico o aparecimento de reações indesejáveis.

**MODO DE USO**

Artelac® é um líquido transparente, livre de partículas visíveis em suspensão.

Salvo prescrição contrária, aplicar uma gota de Artelac no saco conjuntival, de 3 a 5 vezes ao dia ou com maior frequência, caso seja necessário.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

Não use o medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

**REAÇÕES ADVERSAS**

Não há registro de reações adversas para Artelac®.

**SUPERDOSE**

Não há registro de superdose.

**CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO**

Manter Artelac® ao abrigo da luz e da umidade. Conservar em temperatura ambiente (15-30°C) Evitar tocar a ponta do frasco conta-gotas, para reduzir o risco de contaminação do produto.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**

Este medicamento, depois de aberto, somente poderá ser consumido em 30 dias.

Registro MS nº 1.1961.0006.001-1

Resp. Téc.: Ana Paula Ganzer

CRF-RS: 9663

Importado e Distribuído por:

BL Indústria Ótica Ltda.

R. Dona Alzira, 139 - Sarandi

Porto Alegre RS - CEP: 91110-010

CNPJ: 27.011.022/0001-03

Fabricado por:

DR. Gerhard Mann

Chem. Pharm. Fabrik GmbH

13581 - Berlim - Alemanha

Nº do lote, Data de fabricação e Prazo de Validade: Vide Cartucho

0800	702-6464
www	bausch.com.br