

## **LIPOSIC®**

carbômero 2,0 mg/g + sorbitol 48,5 mg/g

**INDICAÇÕES:** É usado como um substituto lacrimal para o tratamento sintomático de condições de olho seco, resultante de distúrbios na secreção e função lacrimal, causada por doenças locais ou sistêmicas, assim como em circunstâncias onde a pálpebra não fecha ou fecha de modo incompleto. **CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS:** Manter em local seco em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Depois de aberto, deverá ser consumido em 06 semanas. Remover as lentes de contato antes da administração, e só podem ser recolocadas após 30 minutos da aplicação. Devido à natureza, em gel, a visão pode se apresentar embaçada por alguns minutos, imediatamente após a administração, e pode prejudicar a habilidade do paciente em dirigir veículos ou operar máquinas. Não deve ser usado durante a gravidez e lactação, exceto sob orientação médica. **REAÇÕES ADVERSAS:** Embora com baixa incidência, têm-se o registro de reações de queimação e vermelhidão nos olhos, e pálpebras coladas (revertido após retirada do medicamento); conjuntivite (canto do olho), com duração de uma semana; e vermelhidão distinta da conjuntiva e córnea, com duração de três a quatro dias. Não existem registros de alterações de exames laboratoriais. **POSOLOGIA:** Aplicar uma gota na conjuntiva de três a cinco vezes por dia ou com maior frequência, e aproximadamente 30 minutos antes de se deitar (do contrário há o risco de grudar a pálpebra). **CONTRA-INDICAÇÕES:** Hipersensibilidade a um dos componentes da fórmula. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Quando usado com outros agentes oftálmicos tópicos, preferencialmente deve ser a última medicação administrada, após um intervalo de cerca de cinco minutos. Reg. MS - 1.1961.0010  
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.  
Data de impressão das peças publicitárias.

