

## DISGREN

Cápsulas. Embalagens com 20 cápsulas de 300 mg.

### USO ADULTO

Composição

Cada cápsula contém:

Triflusal..... 300 mg

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE - DISGREN

Ação esperada do medicamento: **DISGREN** é um inibidor da agregação plaquetária que possui atividade antitrombótica e portanto está indicado no tratamento e prevenção das doenças tromboembólicas e outras doenças que evoluem com hiperatividade das plaquetas, como por exemplo trombose venosa, infarto do miocárdio, etc.

Cuidados de armazenamento: O produto deve ser conservado protegido do calor (abaixo de 25°C) em sua embalagem original.

Prazo de validade: Desde que sejam observados os cuidados de armazenamento, **DISGREN** apresenta prazo de validade de 24 meses. Não utilize o produto com o prazo de validade vencido.

Gravidez e lactação: Este produto está contra-indicado para gestantes e mulheres que estão amamentando. Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Cuidados de administração: **DISGREN** pode ser administrado juntamente com outros medicamentos. Cuidados devem ser tomados com pacientes que fazem uso de anticoagulantes e antidiabéticos orais.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Interrupção do tratamento: Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações adversas: Em pessoas hipersensíveis podem ocorrer distúrbios gástricos que, em geral, desaparecem com o uso de antiácidos.

A Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

### CONTRA-INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES

Este produto está contra-indicado para pacientes com hipersensibilidade ao triflusal ou a salicilatos, em pacientes com hemorragias recentes e com hipoatividade plaquetária.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS - DISGREN

TRIFLUSAL é a Denominação Comum Internacional (DCI) designada pela OMS ao ácido 2-acetoxi-4-trifluorometilbenzóico.

**DISGREN** é um potente inibidor da agregação plaquetária induzida por agentes como ADP, adrenalina e colágeno, que possui uma potente atividade antitrombótica, demonstrada por experiência clínica e farmacológica.

A atividade antiagregante e antitrombótica de **DISGREN** constitui a base fisiológica de sua eficácia na profilaxia e tratamento das doenças tromboembólicas e de outros processos patológicos originados ou que cursam com uma hiperatividade das plaquetas.

## INDICAÇÕES - DISGREN

Tratamento e profilaxia das doenças tromboembólicas, vasculopatias periféricas e alterações cérebro-vasculares;

Prevenção da trombose venosa pós-operatória;

Prevenção do infarto do miocárdio;

Prevenção do reinfarto do miocárdio;

Prevenção das lesões ateroscleróticas;

Redução do risco de doenças vasculares em pacientes com hiperatividade plaquetária;

Prevenção de trombose em enxertos aortocoronários;

Tratamento de microangiopatia diabética.

## CONTRA-INDICAÇÕES - DISGREN

Está contra-indicado em pessoas com hipersensibilidade ao triflusal ou a salicilatos, em pessoas com hipoatividade plaquetária e em pacientes com hemorragias recentes ou úlcera péptica.

## PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS - DISGREN

### Gravidez

Embora não haja evidência da existência de efeitos teratogênicos, não é recomendado o uso de **DISGREN** durante a gravidez.

### Incompatibilidades

Não se conhecem incompatibilidades de **DISGREN** com outros medicamentos. Deve ser administrado com precaução a pacientes submetidos a tratamento com anticoagulantes, já que aumenta sua ação.

**DISGREN** pode potencializar a ação dos hipoglicemiantes orais e obrigar a uma redução de doses dos mesmos.

## REAÇÕES ADVERSAS - DISGREN

Em pessoas hipersensíveis, podem ocorrer distúrbios gástricos que em geral desaparecem com o uso de antiácidos.

## POSOLOGIA - DISGREN

De 1 a 3 cápsulas de **DISGREN** 300 mg ao dia, ou segundo critério médico, preferencialmente durante ou após as refeições.

## SUPERDOSE - DISGREN

No caso de intoxicação acidental, que só pode ocorrer no caso de ingestão de doses muito elevadas, podem aparecer sintomas de excitação ou de depressão do S.N.C., alterações do sistema cárdio-circulatório e respiratório e desequilíbrio eletrolítico.

Hemorragias digestivas e diarreia: o tratamento consiste na administração de uma

suspensão aquosa de carvão ativo. Lavagem gástrica após o esvaziamento do estômago. Manter o equilíbrio eletrolítico. Instalar tratamento sintomático.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

DISGREN®

Triflusal

USO ADULTO

Contém: 20 cápsulas

Composição, indicações, contra-indicações, precauções, reações adversas, posologia, conduta na superdose: vide bula.

Cada cápsula contém:

Triflusal.....300mg

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

CONSERVAR O PRODUTO EM LOCAL SECO E FRESCO EM TEMPERATURA DE ATÉ 25°C.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS