

# mebendazol

Medley.

## IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

### FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Suspensão oral de 20 mg/mL: embalagem contendo frasco de 30 mL, acompanhado de copo-medida.

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

#### USO ORAL

#### COMPOSIÇÕES

Cada ml da suspensão oral contém:  
mebendazol ..... 20 mg  
veículo q.s.p. .... 1 mL  
(ácido cítrico, aroma de caramelo, carmelose sódica, celulose microcristalina, corante amarelo crepúsculo, laurilsulfato de sódio, metilparabeno, propilenoglicol, propilparabeno, sacarose, simeticona, sucralose e água deionizada).

#### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

##### COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O mebendazol suspensão oral atua sobre os principais vermes que parasitam adultos e crianças, provocando a sua desintegração e eliminação nas fezes.

##### PORQUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Este medicamento é um anti-helmíntico polivalente, indicado no tratamento da verminose, especificamente destinado ao tratamento das infestações isoladas ou mistas, causadas por *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Enterobius vermicularis*, *Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*, *Taenia solium* e *Taenia saginata*.

##### QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**CONTRAINDICAÇÕES:** não use mebendazol suspensão oral se você apresentar hipersensibilidade (alergia) ao mebendazol ou aos outros componentes da fórmula.

**ADVERTÊNCIAS:** apenas administre este medicamento em crianças menores de 1 ano de idade sob prescrição médica.

**GRAVIDEZ E AMAMENTAÇÃO:** não se aconselha o uso deste medicamento durante a gravidez, especialmente nos primeiros três meses. Não use se você estiver amamentando.

"Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica."

"Atenção: Este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser usado

com cautela em portadores de Diabetes."

"Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento."

"Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde."

**PRECAUÇÕES:** as parasitoses intestinais são amplamente difundidas em todas as classes sociais, acometendo tanto adultos como crianças. Seguem alguns conselhos sobre:

#### COMO EVITAR A VERMINOSE



1. Beba somente água filtrada ou fervida.



2. Lave cuidadosamente as frutas e verduras e cozinhe bem os alimentos.



3. Coma apenas carne bem passada.



4. Ande sempre com os pés calçados.




5. Lave as mãos antes das refeições e após usar os sanitários.



6. Conserve sempre as unhas cortadas e limpas.



7. Mantenha as instalações sanitárias em boas condições de higiene.



8. Siga corretamente estes conselhos, evitando que os vermes atinjam toda a família.

Consulte regularmente seu médico.

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Informe seu médico se estiver usando cimetidina (um medicamento contra a acidez do estômago), pois neste caso, pode ser necessário ajustar a dose de

0064

0064

mebendazol suspensão oral.

O uso de mebendazol suspensão oral com metronidazol (um medicamento utilizado para infecções bacterianas e por protozoários) deve ser evitado.

"Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis."

#### COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

##### Aspecto físico e características organolépticas

A suspensão é homogênea, levemente alaranjada, com odor de caramelo, sabor adocicado e levemente adstringente.

##### Dosagem

*Infestações por Nematódeos*

5 mL do copo-medida, 2 vezes ao dia, durante 3 dias consecutivos, independente do peso corpóreo e idade.

*Infestações por Cestódeos*

10 mL copo-medida, 2 vezes ao dia, durante 3 dias consecutivos. A posologia para crianças é de 5 mL copo-medida, 2 vezes ao dia, durante 3 dias consecutivos.

##### Como usar

Este medicamento apresenta-se sob a forma de suspensão, administrada por via oral.

Não é necessário seguir uma dieta especial ou utilizar produtos que estimulem a evacuação.

**Agite bem a suspensão antes de usar.**

**"Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica."**

**"Não use o medicamento com o prazo de validade vencido."**

**Antes de usar observe o aspecto do medicamento."**

#### QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

O mebendazol suspensão oral, em geral, é muito bem tolerado. Entretanto, os efeitos indesejáveis a seguir podem ocorrer:

- Dor de estômago de curta duração e diarreia podem ocorrer às vezes, particularmente se a sua infestação por vermes for grave. Estes efeitos são de curta duração e você pode utilizar mebendazol suspensão oral de forma segura em outra ocasião.  
- Hipersensibilidade ao mebendazol suspensão oral é muito rara. Pode ser reconhecida, por exemplo, por erupção cutânea, coceira, encurtamento da respiração e/ou inchaço da face. Se algum destes sintomas ocorrerem, pare de tomar e procure um médico.

- Distúrbio grave da pele consistindo de erupções cutâneas, como bolhas

na pele, feridas na boca, nos olhos ou na região ano-genital, em conjunto com febre foi raramente relatado. Se você apresentar estes sintomas, entre imediatamente em contato com um médico.

- Raramente convulsões podem ocorrer em bebês com o uso deste medicamento.

- Raramente problemas no sangue, fígado e rim podem ocorrer com o uso prolongado deste medicamento em doses substancialmente maiores do que as doses recomendadas (muito maiores do que é normalmente prescrito).

#### O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Se você ingerir uma grande quantidade de mebendazol suspensão oral, poderá sofrer de cólicas estomacais, náuseas, vômitos e diarreia. Se este for o caso, consulte um médico. O médico pode recomendar que utilize carvão ativado, para absorver o mebendazol que estiver em excesso no seu estômago.

#### ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O mebendazol suspensão oral deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 - 30 °C) e protegido da luz.

O prazo de validade deste medicamento é de 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem externa do produto. Não utilize o medicamento se o prazo de validade estiver vencido. Pode ser prejudicial a sua saúde.

#### TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote: vide cartucho.

Farm. Resp.: Dra. Miriam Onoda Fujisawa

CRF-SP nº 10.640

MS - 1.0181.0481

**Medley.**

Medley Indústria Farmacêutica Ltda.

Rua Macedo Costa, 55

Campinas - SP

CNPJ 50.929.710/0001-79

Indústria Brasileira

**S.I.M.**

Serviço de

Informações Medley

0800 7298000

www.medley.com.br

0064



0064

000206410