



Forma Farmacêutica e Apresentação
Solução nasal - Frascos contendo 30 mL

USO NASAL - ADULTO

COMPOSIÇÃO:

Cada mL (30 gotas) de Multisoro adulto contém:

cloridrato de nafazolina.....0,5mg

Excipienteqsp.....1mL

(excipientes: cloreto de benzalcônio, cloreto de sódio*, e água purificada).

*9 mg de cloreto de sódio + água purificada = solução isotônica de cloreto de sódio qsp 1 mL

INFORMAÇÕES AOS PACIENTES

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O cloridrato de nafazolina é um descongestionante nasal de uso local (mucosa do nariz), com um rápido início de ação vasoconstritora (aproximadamente 10 minutos) e com efeito prolongado (entre 2 a 6 horas).

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO? Multisoro adulto tem ação como descongestionante nasal.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CONTRA-INDICAÇÕES: Multisoro adulto é contra-indicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a quaisquer dos componentes da fórmula.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

Multisoro de uso adulto não deve ser administrado concomitantemente com antidepressivos tricíclicos.

Não deve ser administrado em crianças principalmente menores de 12 anos. Multisoro adulto deve ser utilizado com cautela em pacientes com problemas cardiovasculares e hipertireoidismo, diabetes mellitus, hipertrofia prostática e pacientes que apresentem forte reação a agentes simpatomiméticos, evidenciada por sinais de insônia ou vertigem.

Não use ininterruptamente por longos períodos. O frasco não deve ser utilizado por mais de uma pessoa com a finalidade de diminuir o risco de contaminação e transmissão do processo infeccioso.

Multisoro adulto destina-se ao uso tópico nasal.

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao médico se está amamentando.

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis, tais como: queimação ou ardência.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Recomenda-se precaução no uso do produto nos pacientes em tratamento com inibidores da monoaminoxidase.

O uso concomitante de Multisoro adulto com antidepressivos tricíclicos pode levar a uma potencialização dos efeitos pressóricos da nafazolina. Observação: Embora estas reações não sejam específicas da nafazolina, a possibilidade de interação medicamentosa deve ser considerada.

Não deve ser utilizado durante a gravidez.

Este medicamento é contra-indicado em crianças principalmente menores de 12 anos.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Características do produto: Multisoro tem aspecto líquido e incolor.

Posologia: Gotear 2 a 4 gotas em cada narina, 4 a 6 vezes ao dia.

SIGA A ORIENTAÇÃO DE SEU MÉDICO, RESPEITANDO SEMPRE OS HORÁRIOS, AS DOSES E A DURAÇÃO DO TRATAMENTO.

NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO.

ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Pode ocorrer irritação local passageira (queimação, ardência, espirros). Já foram descritas ocorrências de náusea e cefaléia. Pacientes diabéticos podem ter o valor da glicemia elevados com o uso crônico da nafazolina. O uso crônico

do Multisoro adulto pode apresentar congestão nasal por efeito rebote e seu uso prolongado pode acarretar rinite medicamentosa.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTES MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Nos casos de superdosagem com Multisoro adulto, podem ocorrer arritmias cardíacas, cefaléia, náuseas e vômitos, bradicardia, hipotensão ou hipertensão, hiperemia e depressão do sistema nervoso central. Recomenda-se procurar o serviço médico o mais rápido possível, para observação e medicação apropriada conforme a gravidade do quadro clínico.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Multisoro adulto deve ser conservado em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C) e protegido da luz.

Multisoro adulto apresenta uma validade de 24 meses a contar da data de sua fabricação. Nunca use medicamento com o prazo de validade vencido, além de não obter o efeito desejado, pode prejudicar a sua saúde.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

PROPRIEDADES FARMACODINÂMICAS E FARMACOCINÉTICAS:

O cloridrato de nafazolina é um agonista alfa-adrenérgico utilizado como vasoconstritor e descongestionante nasal, com um rápido início de ação vasoconstritora (aproximadamente 10 minutos) e com efeito prolongado (entre 2 a 6 horas). A administração intranasal da nafazolina leva a um processo de constrição dos vasos dilatados da mucosa nasal, reduzindo o fluxo sanguíneo e o edema tissular.

INDICAÇÕES: Como descongestionante de uso tópico nasal.

CONTRA-INDICAÇÕES: Multisoro adulto é contra-indicado no caso de hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da formulação.

Multisoro adulto é contra-indicado em crianças principalmente menores de 12 anos e durante a gravidez. Risco de teratogenicidade na gravidez: categoria C.

Multisoro adulto destina-se ao uso tópico nasal, sendo contra-indicado seu uso em inaloterapia.

MODO DE USAR E CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO DEPOIS DE ABERTO

Multisoro adulto, apresenta uma validade de 24 meses a contar da data de sua fabricação.

POSOLOGIA: Gotear 2 a 4 gotas em cada narina, 4 a 6 vezes ao dia.

ADVERTÊNCIAS: Utilizar com cautela em pacientes com problemas cardiovasculares e hipertireoidismo, diabetes mellitus, hipertrofia prostática e pacientes que apresentem forte reação a agentes simpatomiméticos, evidenciada por sinais de insônia ou vertigem. Não deve ser usado ininterruptamente durante longos períodos.

O frasco não deve ser utilizado por mais de uma pessoa com a finalidade de diminuir o risco de contaminação e transmissão do processo infeccioso.

Não deve ser utilizado durante a gravidez.

USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO

As mesmas orientações dadas aos adultos devem ser seguidas para os pacientes idosos, observando-se as recomendações específicas para grupos de pacientes descritos nos itens "Precauções" e "Contra-Indicações".

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Recomenda-se precaução no uso do produto nos pacientes em tratamento com inibidores da monoaminoxidase.

O uso concomitante de Multisoro adulto com antidepressivos tricíclicos pode levar a uma potencialização dos efeitos pressóricos da nafazolina. Observação: Embora estas reações não sejam específicas da nafazolina, a possibilidade de interação medicamentosa deve ser considerada.

REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS

Pode ocorrer irritação local passageira (queimação, ardência, espirros). Já foram descritas ocorrências de náusea e cefaléia. Pacientes diabéticos podem ter o valor da glicemia elevados com o uso crônico da nafazolina.

O uso crônico de Multisoro adulto pode apresentar congestão nasal por efeito rebote e seu uso prolongado pode acarretar rinite medicamentosa.

SUPERDOSE: Nos casos de superdosagem com Multisoro adulto, podem ocorrer arritmias cardíacas, cefaléia, náuseas e vômitos, bradicardia, hipotensão ou hipertensão, hiperemia e depressão do sistema nervoso central. Recomenda-se procurar o serviço médico o mais rápido possível, para observação e medicação apropriada conforme a gravidade do quadro clínico.

ARMAZENAGEM: Multisoro adulto deve ser conservado em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C) e protegido da luz. Apresenta uma validade de 24 meses a contar da data de sua fabricação.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.



SAC:
0800 600 0660

MULTILAB IND. E COM. DE PROD. FARM. LTDA.

RS 401 - Km 30 - nº 1009 - São Jerônimo - RS

CEP 96700-000 - CNPJ: 92.285.552/0001-40

Data de fabricação, lote e validade: vide cartucho

Reg. MS. Nº 1.1819.0020

Farm. Resp. Téc.: Almeici Lucia Werle Cavedon CRF-RS 5202

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Venda Sob Prescrição Médica

Rev.02
13/08/10

700779