

Eparema®

NYCOMED

Peumus boldus, Rhamnus purshiana e Rheum palmatum
Boldo, Cáscara Sagrada e Ruibarbo

FITOTERÁPICO

Drágeas - Solução Oral - Flaconetes

Leia com atenção, antes de usar o produto.

Formas farmacêuticas, apresentações e via de administração

Drágea. Embalagens com 2 blisters com 10 unidades e 30 blisters com 4 unidades - **USO ADULTO E CRIANÇAS ACIMA DE 10 ANOS.**

Solução oral. Frascos com 200 ml - **USO ADULTO.**

Flaconete. Embalagens com 12 e 60 flaconetes com 10 ml - **USO ADULTO.**

Uso oral

Composição

Cada drágea contém:

Extrato mole composto de Boldo, Cáscara Sagrada e Ruibarbo 125 mg
Excipiente q.s.p. 1 drágea
Excipientes: dióxido de silício, povidona, estearato de magnésio, gelatina, lactose, talco, celulose microcristalina, sacarose, corante amarelo tartrazina, cera de carnaúba, carbonato de cálcio, dióxido de titânio, goma laca, goma arábica e óleo de ricínio.

OBS: Cada drágea contém 0,11 g de açúcar na forma de sacarose.

Cada colher das de chá (5 ml) da solução oral contém:

Extrato fluido composto de Boldo, Cáscara Sagrada e Ruibarbo 1030 mg
Veículo q.s.p. 5,00 ml
Excipientes: sacarose, álcool etílico, glicerol, hidróxido de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sorbitol, essência de mentoliptus, tintura de laranja amarga, sacarina sódica e água purificada.

OBS: Cada 5 ml da solução contém 0,5 g de açúcar na forma de sacarose.

Cada flaconete (10 ml) contém:

Extrato fluido composto de Boldo, Cáscara Sagrada e Ruibarbo 1030 mg
Veículo q.s.p. 10,00 ml
Excipientes: sacarose, álcool etílico, caramelo tipo C, glicerol, hidróxido de sódio, metilparabeno, propilparabeno, sorbitol, essência de mentoliptus, tintura de laranja amarga, sacarina sódica e água purificada.

OBS: Cada flaconete contém 1,1 g de açúcar na forma de caramelo e sacarose.

Concentração dos princípios ativos

Cada drágea contém 125 mg de extrato mole composto de Boldo, Cáscara Sagrada e Ruibarbo calculado para conter 0,05 mg a 0,10 mg de boldina, 7,87 a 14,61 mg de cascarosídeo, 0,56 mg a 1,04 mg de antraquinona e 0,56 mg a 1,04 mg de emodina.

Cada 5 ml da solução oral contém 1030 mg de extrato

fluido composto de Boldo, Cáscara Sagrada e Ruibarbo calculado para conter 0,05 mg a 0,10 mg de boldina, 7,87 a 14,61 mg de cascarosídeo, 0,56 mg a 1,04 mg de antraquinona e 0,56 mg a 1,04 mg de emodina.
Cada flaconete (10 ml) contém 1030 mg de extrato fluido composto de Boldo, Cáscara Sagrada e Ruibarbo calculado para conter 0,05 mg a 0,10 mg de boldina, 7,87 a 14,61 mg de cascarosídeo, 0,56 mg a 1,04 mg de antraquinona e 0,56 mg a 1,04 mg de emodina.

Nomenclatura botânica e parte utilizada da planta

Boldo: *Peumus boldus* Molina (Monimiaceae), folha.
Cáscara Sagrada: *Rhamnus purshiana* D.C. (Rhamnaceae), casca.
Ruibarbo: *Rheum palmatum* Linné (Polygonaceae), rizoma e raiz.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Quando devo usar e qual é a ação esperada de Eparema®?

Eparema® é indicado para os distúrbios do fígado e das vias biliares, pois estimula a produção e a eliminação da bile, substância que facilita a digestão de gorduras. Eparema® também é indicado nos casos de prisão de ventre leve, porque funciona como um laxante suave, que não induz ao hábito.

Para você saber a dose adequada de Eparema®, veja o item posologia. Você pode tomar Eparema® antes, durante ou após as refeições.

Devido à presença de extratos vegetais, Eparema® pode ter seu sabor alterado ao longo do tempo, sem comprometimento do seu efeito terapêutico.

Como devo guardar Eparema®?

Você deve guardar o produto na embalagem original, dentro do cartucho e à temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Qual é o prazo de validade de Eparema®?

O prazo de validade está impresso na embalagem externa do produto. Não use medicamento com o prazo de validade vencido, pois, além de não obter o efeito desejado, você estará prejudicando sua saúde.

Posso usar Eparema® durante a gravidez e a amamentação?

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao seu médico se estiver amamentando.

Existe algum cuidado especial para usar Eparema®?

Se você for diabético, deve conversar com o seu médico, pois o produto contém açúcar.

Caso o uso do produto esteja sendo feito sob recomendação médica, siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não existem outros cuidados especiais para você usar Eparema®.

Posso interromper o tratamento com Eparema®?

Sim, você pode interromper o tratamento a qualquer momento. Caso o uso do produto esteja sendo feito sob recomendação médica, não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Podem ocorrer reações desagradáveis com o uso de Eparema®?

Ainda não são conhecidas reações desagradáveis com o uso do produto.

Procure orientação de um médico, caso você apresente reações desagradáveis com o uso do produto.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Quando estou usando Eparema®, posso fazer uso de outras substâncias?

Não existe nenhuma restrição quanto ao uso de bebidas e de alimentos.

Quando eu não devo usar Eparema® e quando devo utilizá-lo com cuidado?

Você não deve usar Eparema® se for alérgico aos componentes de sua fórmula.

Se você for diabético, deve conversar com o seu médico sobre o uso do produto.

Não existem relatos de que Eparema® interfira com a ação de outros medicamentos. Porém, você deve informar ao seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

Eparema® drágeas contém o corante amarelo de tartrazina que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

Riscos da automedicação: NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características

Eparema® é um produto fitoterápico, composto pelos extratos vegetais de Boldo, Cáscara Sagrada e Ruibarbo. Os extratos vegetais associados fluidificam a bile e aceleram sua eliminação para o intestino. Adicionalmente, promovem uma branda ação laxante, evitando a constipação sem levar ao hábito nem causar danos ao trato intestinal.

Devido à presença de extratos vegetais, Eparema® pode ter seu sabor alterado ao longo do tempo, sem comprometimento do seu efeito terapêutico.

Indicações

Distúrbios hepato-biliares, funcionando como colágeno e colerético.

Tratamento suave e eficaz da prisão de ventre, sem induzir ao hábito.

Contra-indicações

Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

Precauções

O uso deste produto por diabéticos deve ser feito sob orientação médica face a presença de açúcar na sua composição.

Não existem outros cuidados específicos para a administração do produto.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

Eparema® drágeas contém o corante amarelo de tartrazina que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico.

Interações medicamentosas

Até o momento, não foram relatados casos de interações medicamentosas com o uso do produto.

Reações adversas

Ainda não foram relatadas reações adversas com o uso do produto, não sendo conhecidas, portanto, a intensidade e a frequência destas.

Posologia

Eparema® solução oral

Adultos: 1 colher das de chá, pura ou diluída em pequeno volume de água, 2 vezes ao dia.

Em casos de prisão de ventre, poderão ser tomadas mais 1 ou 2 colheres das de chá ao deitar.


Eparema® drágeas

Adultos: 1 drágea, 2 vezes ao dia. Em casos de prisão de ventre, poderão ser tomadas mais 1 ou 2 drágeas, ao deitar. Crianças acima de 10 anos: 1 drágea, 1 ou 2 vezes ao dia.


Eparema® flaconetes

Adultos: 1 flaconete, 2 vezes ao dia. Em casos de prisão de ventre, poderão ser tomados mais 1 ou 2 flaconetes, ao deitar.

Modo de usar o flaconete:



Romper o flaconete na área picotada.



Com o flaconete na boca, apertar levemente o fundo da embalagem.

Superdose

Não existem relatos de superdose com o uso do produto. Na eventualidade da ingestão acidental de doses muito acima das habitualmente utilizadas, com manifestações clínicas de intoxicação, recomenda-se adotar medidas de controle das funções vitais.

Pacientes idosos

Não existem recomendações especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

MS - 1.0639.0030

Farmacêutico Responsável: Wagner Moi

CRF-SP nº 14.828

Nº do lote, data da fabricação e data da validade: vide cartucho.

Nycomed Pharma Ltda.

Rodovia SP 340 S/N, Km 133,5

Jaguariúna - SP

CNPJ 60.397.775/0008-40

Indústria Brasileira

EP00_NSPC_1008

Cód. Laetus: 213

Cód.: 1032123

150x210 mm

EM CASO DE DÚVIDAS LIGUE GRATUITAMENTE

SAC: 0800-7710345

www.nycomed.com.br