

Atossion®

dropropizina

USO ADULTO E/OU PEDIÁTRICO
(Crianças maiores de 2 anos de idade.)

USO ORAL

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

ATOSSION® (dropropizina) Xarope Adulto: frasco de 100 mL

ATOSSION® (dropropizina) Xarope Pediátrico: frasco de 60 mL

COMPOSIÇÃO

Cada ml xarope adulto contém:

dropropizina.....3 mg

Excipientes: corante vermelho bordeaux, ciclamato de sódio, sacarose, álcool etílico, metilparabeno, propilparabeno, ácido cítrico, aroma de framboesa, aroma de baunilha, sacarina sódica e água purificada.

Cada ml xarope pediátrico contém:

dropropizina.....1,5 mg

Excipientes: corante vermelho bordeaux, ciclamato de sódio, sacarose, álcool etílico, metilparabeno, propilparabeno, ácido cítrico, aroma de framboesa, aroma de baunilha, sacarina sódica e água purificada.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

ATOSSION® (dropropizina) é um medicamento contra tosse que age bloqueando os receptores da tosse. Apresenta uma discreta ação antialérgica, podendo ser usado no tratamento da tosse associada à condição alérgica. A dropropizina é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal, com início de ação entre 15 e 30 minutos após a sua administração por via oral (por boca).

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

ATOSSION® (dropropizina) está indicado para o tratamento dos sintomas da tosse irritante e seca (sem secreção).

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CONTRA-INDICAÇÕES

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE.

ATOSSION® (dropropizina) é contra-indicado em indivíduos que apresentem alergia à dropropizina, insuficiência respiratória grave, hipotensão (queda da pressão arterial), em pacientes asmáticos e em crianças com menos de 2 anos de idade. Não deve ser usado em casos de tosse produtiva (com secreção).

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O tratamento com ATOSSION® (dropropizina) deve ter a duração mais curta possível, geralmente poucos dias. Se os sintomas persistirem, você deverá procurar o seu médico para ser reavaliado.

Os pacientes com sensibilidade aumentada à dropropizina devem ter cuidado ao dirigir veículos ou operar máquinas, devido à possibilidade de hipotensão (queda da pressão arterial) ou sonolência. ATOSSION® deve ser usado com cuidado em idosos e em pacientes com alteração da função dos rins ou do fígado.

É recomendável que o uso de antitussígenos em crianças de 2 a 6 anos seja limitado.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

Gravidez e lactação: ATOSSION® (dropropizina) não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. Informe seu médico se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.

INFORME AO MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.

ATENÇÃO DIABÉTICOS: CONTÉM AÇÚCAR.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O uso de ATOSSION® (dropropizina), junto com álcool e depressores do SNC pode levar a um aumento dos efeitos colaterais da dropropizina, como a hipotensão e a sonolência.

INFORME AO SEU MÉDICO SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Aspecto físico: líquido xaroposo límpido, livre de impurezas, de cor rosa pink e odor de framboesa e baunilha.

DOSAGEM

ATOSSION® (dropropizina) xarope adulto: Adultos e crianças maiores de 12 anos: 10 mL por via oral, 4 vezes ao dia (utilizar o copo-medida até a marca indicativa de 10 mL).

ATOSSION® (dropropizina) xarope pediátrico: Crianças de 2 a 3 anos: 2,5 mL a 5 mL por via oral, 4 vezes ao dia (utilizar o copo-medida até a marca indicativa de mL). Crianças acima de 3 anos: 10 mL, 4 vezes ao dia (utilizar o copo-medida até a marca indicativa de 10 mL).

O QUE DEVO FAZER SE ESQUECER DE TOMAR UMA DOSE DO MEDICAMENTO?

Em caso de esquecimento esperar até o horário de tomada da próxima dose. Não tomar mais do que a dose normal recomendada.

NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO. SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

As reações adversas raramente são observadas nas doses recomendadas. No caso de uso em doses mais altas ou de sensibilidade aumentada à dropropizina, as reações mais frequentes são a hipotensão (queda da pressão arterial) e a sonolência.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTES MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Os sintomas da superdosagem de ATOSSION® (dropropizina) são hipotensão (queda de pressão arterial) e sonolência. Não existe antídoto específico. O tratamento usual da superdosagem aguda é a provocação do vômito, o mais precocemente possível, a não ser que o paciente esteja inconsciente. No hospital, a lavagem gástrica somente é útil se aplicada precocemente, devido à rápida absorção intestinal da dropropizina.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar evitando-se calor excessivo (temperatura superior a 40°C) e ao abrigo de luz, antes e após a abertura do frasco.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORADO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

DIZERES LEGAIS

Registro M.S.: 1.0385.0002

Farmacêutico(a) responsável: Alexandre Madeira de Oliveira - CRF/SC-3684

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO ELOFAR LTDA

S.A.C. 0800-600-1344 - sac@elofar.com.br - www.elofar.com.br

Rua Tereza Cristina, 67 - Florianópolis - Santa Catarina - CEP 88070-790

CNPJ: 83.874.628/0001-43 - INDÚSTRIA BRASILEIRA