

# Torlós-H

**Losartana potássica 50 mg**  
**Hidroclorotiazida 12,5 mg**

**Uso adulto**

**Composição e apresentação** - Cada comprimido contém: Losartana potássica 50 mg e Hidroclorotiazida 12,5 mg. Embalagens com 14 e 28 comprimidos.

**Indicação** - Hipertensão arterial.

**Contraindicações** - Hipersensibilidade a losartana e/ou à hidroclorotiazida ou aos demais componentes da fórmula. Durante a gravidez e lactação: quando a gravidez for detectada, a medicação deve ser suspensa ou substituída de imediato. Pacientes com anúria ou hipersensibilidade a outras drogas derivadas da sulfanilamida.

**Advertências e precauções** - Insuficiência renal ou hepática graves. Tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca ou depletados de sódio, pois pode produzir um quadro de hipotensão severa. Pacientes com enfermidade cerebrovascular ou cardiopatia isquêmica, nos quais o quadro pode se agravar como consequência de uma hipotensão severa. Pacientes com função hepática deteriorada ou doença hepática progressiva. Os tiazídicos podem exacerbar ou ativar o lúpus eritematoso sistêmico. Os pacientes recebendo tratamento com tiazídicos devem ser observados para os sinais de hiponatremia, alcalose, hipocloremia, hipocalemia, hipomagnesemia ou hipercalemia. Em pacientes diabéticos pode requerer ajustes na dose de insulina ou hipoglicemiantes orais. Diabetes *mellitus* latente pode se tornar manifesto durante a terapia com tiazídicos.

**Interações medicamentosas** - Tem-se comunicado toxicidade ao lítio em pacientes em tratamento com drogas que aumentam a eliminação de sódio. O uso concomitante com álcool, barbitúricos ou narcóticos pode provocar hipotensão ortostática. A absorção da hidroclorotiazida é fortemente reduzida pelo uso concomitante de resinas tipo colestiramina ou colestipol. O uso conjunto com ACTH intensifica a depleção eletrolítica, podendo levar à hipocalemia. O uso com AINEs pode reduzir o efeito diurético e anti-hipertensivo dos tiazídicos. O uso com corticosteroides pode causar hipocalemia. Com metotrexato, pode ocasionar granulocitopenia. Propranolol pode intensificar o efeito hiperglicêmico da hidroclorotiazida.

**Reações adversas** - *Mais frequentes*: Mal-estar epigástrico, diarreia, mialgia, câibras musculares, tonturas, insônia, congestão nasal, astenia, fraqueza, edema ou inchaço local, náuseas, faringites, cefaleia, hipotensão ortostática. Todos estes efeitos foram geralmente leves e não levaram à interrupção do tratamento.

**Posologia** - Dose inicial é de 1 comprimido 1x ao dia. Após cerca de 3 semanas, a dose pode ser aumentada para 2 comprimidos 1x ao dia.

Venda Sob Prescrição Médica.

Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.

Registro no M.S. 1.0525.0004.

**TORRENT do Brasil Ltda.**